

# VACUNACIÓN E IGT FRENTE AL TÉTANOS

## - ANTE HERIDAS -



	HERIDA LIMPIA		HERIDA TETANÍGENA	
	VACUNA	IGT	VACUNA	IGT
< 3 dosis o desconocida (completar vacunación)	SÍ	NO	SÍ (completar vacunación)	SÍ
3 o 4 dosis 1 dosis si > 10 años última dosis	NO	NO	NO 1 dosis si > 5 años última dosis	NO*
5 o más dosis	NO	NO	NO valorar según herida si > 10 años última dosis	NO*

\* SALVO EN HERIDAS DE ALTO RIESGO (herida tetanígena contaminada con esporas o con gran tejido desvitalizado).

En inmunodeprimidos y usuarios de drogas por vía parenteral

→ PONER IGT (Si herida tetanígena, independientemente del nº de vacunas).











PAUTA PRIMOVACUNACIÓN (3 DOSIS)



Los hombres nacidos entre 1949-1983 que hicieron el servicio militar tienen 3 dosis

## HERIDAS POTENCIALMENTE TETANÍGENAS

- Herida o quemadura con un importante grado de tejido desvitalizado 
- Herida punzante en contacto con suelo o estiércol 
- Contaminadas con cuerpo extraño 
- Fracturas con herida 
- Mordeduras 
- Lesiones por congelación 
- Las que requieren intervención quirúrgica si se retrasa más de 6h 
- En pacientes con sepsis sistémica 



Contenido revisado por el Comité Técnico de la Subcomisión de EFYC.

Más información en:

<https://udsalamancaeir.wordpress.com>



AUTORES: Andrea Sánchez Martínez, Irene Martín Sanz, Irene Tabernero de Arriba, Pablo Martínez García, María Limorti Martín, Isabel Bautista Blázquez